

LA CLAVICULE

1- Définition

Os allongé, il est situé à la **partie antéro-supérieure du thorax** entre le cou et la région **pectorale**.

2- Orientation :

Trois critères :

- L'extrémité aplatie en dehors.
- Cette extrémité présente une courbure, elle est concave vers l'avant.
- La face lisse regarde vers le haut.

3- Situation et forme anatomique

Sous-cutanée, elle est interposée entre le **Sternum** en dedans à sa partie supéro-externe et l'**Acromion de la Scapula** en dehors.

Disposée en S italique, la **clavicule** présente deux courbures:

- Une interne très apparente à convexité antérieure.
- L'autre externe à convexité postérieure.

Aplatie dans sa partie externe et arrondie dans sa partie interne et par suite de sa forme, la clavicule présente à décrire;

- **Deux faces** (supérieure et inférieure).
- **Deux bords** (antérieur et postérieur).
- **Deux extrémités** (latérale/acromiale et médiale/sternale).

4- Description

a. Les faces

i. La face supérieure

- Dans son tiers latéral elle est plane et élargie et rugueuse au voisinage de ses bords par suite des empreintes des insertions des muscles: deltoïde en avant et le trapèze en arrière.
 - Dans sa partie moyenne elle est lisse et dépourvue d'insertion musculaire.
- Au niveau de son tiers interne, elle donne, vers l'avant, insertion au muscle grand pectoral et en arrière au muscle sterno-cleido-mastoïdien.

ii. La face inférieure

- A sa partie moyenne la face inférieure est creusée d'une gouttière allongée s'étendant sur tout le corps de l'os. c'est la gouttière sub - Clavière ou s'insère le muscle sub - clavier.

b. Les bords

i. Le bord antérieur

- Dans son tiers médial, il est large et convexe, donnant insertion au muscle grand pectoral.
- Dans son tiers latéral, il est mince et concave donnant insertion au muscle deltoïde.

ii. le bord postérieur

- Dans son tiers latéral, il est épais et convexe en arrière donnant insertion au **muscle trapèze**,
- Dans sa partie médiale il est concave en arrière donnant insertion au voisinage de **la facette sternale au muscle sterno-cleido - mastoïdien**.

c. Les extrémités

i. L'extrémité sternale (médiale)

Volumineuse, elle est pourvue d'une facette articulaire: **la facette sternale**. Elle présente à sa partie inférieure **l'empreinte du ligament costo-claviculaire**.

ii. L'extrémité acromiale (latérale)

Mince et aplatie, elle est déportée en avant et se termine par une facette articulaire: **la facette acromiale**.

Cette extrémité présente à sa partie inférieure, une empreinte rugueuse pour l'insertion du **ligament trapézoïde**, et, un petit tubercule pour **le ligament conoïde**.

d. Clinique

- Fracture de la clavicule (1/3 moyen) avec mobilité en touche de piano.
- Syndrome canalaire de la pince costo-claviculaire (Syndrome de Raynaud).



